



Российские вакцины против коронавируса



Заразиться COVID-19 непосредственно от вакцины невозможно

- Разработчик
- Тип вакцины
- Принцип действия
- Вводится
- Устойчивый иммунитет

Спутник V («Гам-КОВИД-Вак»)

НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи

Профилактическая*

На основе аденовируса и гена белка SARS-CoV-2. Вирус доставляет в клетку генетический материал, но не может размножаться и вызвать заболевание. После введения организм начинает вырабатывать антитела

Двукратно, с интервалом в 3 недели

Формируется через 21 день после второй вакцинации

На данный момент иммунитет подтвержден на интервале 5–7 месяцев. Прогнозный иммунитет: как минимум на год, но точные данные покажут дальнейшие наблюдения за привитыми и переболевшими

Возможные побочные явления

- Кратковременное повышение температуры
- Головная боль

«ЭпиВакКорона»

ГНИ вирусологии и биотехнологии «Вектор»

Профилактическая*

На основе пептидов — фрагментов белка S-SARS-CoV-2. Пептиды закреплены на белке-носителе, который вместе с гидроксидом алюминия помогает усилить иммунный ответ. После введения в организм стимулирует выработку антител

Двукратно, с интервалом в 2–3 недели

Формируется через 30 дней после второй вакцинации

Вакцина НИИ им. М.П. Чумакова

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН

Профилактическая*

На основе инактивированного вируса. Вместе с ним и вспомогательным веществом, гидроксидом алюминия, в организме запускается иммунный ответ

Двукратно, с интервалом в 2 недели

Формируется на 14 день после второй вакцинации

- Першение в горле
- Сыпь
- Аллергические реакции

* Не лечит, а защищает от заболевания